

ESQUEMAS VACINAIS COVID-19, MINAS GERAIS

ATUALIZAÇÃO – 11/02/2022

ACIMA DE 18 ANOS, NÃO GESTANTE OU PUÉRPERA			
Vacina contra a COVID-19	D2	Reforço	
		Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidoses)	4 semanas (28 dias) após D1	4 meses após D2	Preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Astrazeneca	8 semanas após D1	4 meses após D2	Preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	4 meses após D2	Preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Janssen	NÃO se aplica	2 meses após D1	Janssen

ATENÇÃO: Os esquemas de vacinação podem ser modificados conforme a evolução do conhecimento científico e a situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil.

ACIMA DE 18 ANOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS			
Vacina contra a COVID-19	D2		Reforço
		Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidoses)	4 semanas (28 dias) após D1	4 meses após D2	Comirnaty/Pfizer
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	4 meses após D2	Comirnaty/Pfizer

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS		
Vacina contra a COVID-19	D2	Volume da dose
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	0,3 ml

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS DE IDADE, NÃO IMUNOCOMPROMETIDAS		
Vacina contra a COVID-19	D2	Volume da dose
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidoses)	28 dias (4 semanas)	0,5 ml

ATENÇÃO: Os esquemas de vacinação podem ser modificados conforme a evolução do conhecimento científico e a situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil.

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS		
Vacina contra a COVID-19	D2	Volume da dose
Comirnaty/Pfizer PEDIÁTRICA	8 semanas	0,2 ml

ACIMA DE 18 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDO, NÃO GESTANTE OU PUÉRPERA					
Vacina contra a COVID-19	D2	D3 (Dose adicional)		DR (Dose de Reforço)	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidoses)	4 semanas (28 dias) após D1	A partir de 8 semanas após D2	Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose OU multidoses) - Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional ou D3	Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca
Astrazeneca	8 semanas após D1	A partir de 8 semanas após D2	Astrazeneca - Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional ou D3	Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	A partir de 8 semanas após D2	Comirnaty/Pfizer - Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional ou D3	Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca
Janssen					
Dose única	DR (Dose de Reforço)	Dose adicional	DR (Dose de Reforço)		
			Intervalo	Imunizante	
Janssen (Dose única - DU)	Dose de reforço (DR) 8 semanas após DU	Não recomendada	4 meses após dose adicional	4 meses após dose adicional	

ATENÇÃO: Os esquemas de vacinação podem ser modificados conforme a evolução do conhecimento científico e a situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil.

ACIMA DE 18 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS					
Vacina contra a COVID-19	D2	D3 (Dose adicional)		Reforço	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidoses)	4 semanas (28 dias) após D1	A partir de 8 semanas após D2	Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidoses) - Mesmo imunizante do esquema primário.	A partir de 4 meses após a dose adicional ou D3	Preferencialmente Comirnaty/Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	A partir de 8 semanas após D2	Comirnaty/Pfizer - Mesmo imunizante do esquema primário.	A partir de 4 meses após a dose adicional ou D3	Preferencialmente Comirnaty/Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDAS, INCLUINDO GESTANTES OU PUÉRPERAS IMUNOCOMPROMETIDAS			
Vacina contra a COVID-19	D2	D3 (Dose Adicional)	Dose de reforço
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	8 semanas após D2	A partir de 4 meses após a dose adicional ou D3

ATENÇÃO: Os esquemas de vacinação podem ser modificados conforme a evolução do conhecimento científico e a situação epidemiológica da COVID-19 no Brasil.