


ESQUEMA VACINAL DE DOSES - POR GRUPO ETÁRIO - atualização 22/12/2022

PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM ASTRAZENECA, PFIZER, CORONAVAC



Esquema primário

- CoronaVac: Intervalo de 4 semanas (28 dias) após D1.
- Comirnaty/Pfizer: Intervalo de 3 semanas (21 dias) após D1, para 12 anos ou mais de idade - Conforme Deliberação CIB-SUS-MG Nº 3632.
- AstraZeneca: Intervalo de 8 semanas após D1.
- Pfizer pediátrica (05 a 11 anos): Intervalo de 8 semanas após D1.
- *Pfizer "baby" (6 meses a 2 anos): D1 – D2: 4 semanas (1 mês) e D2 – D3: 8 semanas (2 meses).

*Recomendação de três doses no esquema primário com o imunizante da Pfizer para crianças de 6 meses a 2 anos de idade, conforme DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 4.071, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

VACINAS RECOMENDADAS PARA DOSES DE REFORÇO

18 anos+: AstraZeneca OU Pfizer OU Janssen

Trabalhadores de saúde:
indicado 2º reforço a partir de 18 anos
AstraZeneca OU Pfizer OU Janssen

12 a 17 anos: Pfizer, caso não disponível, utilizar CoronaVac

Gestantes: Pfizer, caso não disponível, utilizar CoronaVac

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.
2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA IMUNOCOMPROMETIDOS - atualização 22/12/2022

IMUNOCOMPROMETIDOS PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM ASTRAZENECA, PFIZER, CORONAVAC



Esquema primário

- **Coronavac:** Intervalo de 4 semanas (28 dias) após D1.
- **Comirnaty/Pfizer:** Intervalo de 3 semanas (21 dias) após D1, para 12 anos ou mais de idade - Conforme Deliberação CIB-SUS-MG Nº 3632.
- **AstraZeneca:** Intervalo de 8 semanas após D1.

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.
2^a edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.




SAÚDE



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO POR GRUPO ETÁRIO, PARA QUEM INICIOU ESQUEMA COM JANSSEN - atualização 22/12/2022

GRUPO ETÁRIO PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM JANSSEN



Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19.
2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.



SAÚDE



GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA IMUNOCOMPROMETIDOS, QUE INICIARAM ESQUEMA COM JANSSEN - atualização 22/12/2022

IMUNOCOMPROMETIDOS PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM JANSSEN

Intervalo de 8 semanas
Intervalo de 4 meses
Intervalo de 4 meses
Intervalo de 4 meses



DOSE
ADICIONAL
REFORÇO
2º
REFORÇO
3º
REFORÇO



VACINAS RECOMENDADAS PARA DOSES DE REFORÇO

AstraZeneca OU
Pfizer OU Janssen

Gestantes:
Imunizante NÃO
recomendado para
esse grupo

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.