


ESQUEMA VACINAL DE DOSES - POR GRUPO ETÁRIO - atualização 09/01/2023

PARA QUEM INICIOU ESQUEMA COM ASTRAZENECA, PFIZER, CORONAVAC



VACINAS RECOMENDADAS DOSES REFORÇO

5 a 11 anos: Pfizer pediátrica
(Intervalo 4 meses após D2)

***18 a 39 anos: Preferencialmente
Pfizer, na indisponibilidade AstraZeneca
OU Janssen

40 anos + : AstraZeneca OU Janssen
OU Pfizer.

Trabalhadores de saúde: indicado
2º reforço a partir de 18 anos
Pfizer OU AstraZeneca OU
Janssen

12 a 17 anos: Pfizer,
caso não disponível,
utilizar CoronaVac

Gestantes: Pfizer, caso
não disponível, utilizar
CoronaVac

Esquema primário

- CoronaVac: Intervalo de 4 semanas (28 dias) após D1.
- Comirnaty/Pfizer: Intervalo de 3 semanas (21 dias) após D1, para 12 anos ou mais de idade -
- Conforme Deliberação CIB-SUS-MG Nº 3632.
- AstraZeneca: Intervalo de 8 semanas após D1.
- Pfizer pediátrica (05 a 11 anos): Intervalo de 8 semanas após D1.
- * Pfizer "baby" (6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias): D1 - D2: 4 semanas (1 mês) e D2 - D3: 8 semanas (2 meses).

*Recomendação de três doses no esquema primário com o imunizante da Pfizer para crianças de 6 meses a 4 anos de idade, conforme NOTA TÉCNICA Nº 399/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 27/12/2022.

-Crianças de 3 e 4 anos de idade que iniciaram o seu esquema de vacinação com a vacina COVID-19 Coronavac, deverão ter seu esquema primário finalizado com esta vacina (esquema primário da vacina COVID-19 de duas doses),


** NOTA TÉCNICA Nº 406/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 02/01/2023 que recomenda a dose de reforço da vacina COVID-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade.

*** NOTA TÉCNICA Nº 393/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 02/01/2023 que traz recomendações atuais para vacinação contra a Covid-19 com vacinas de vetor viral.

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA IMUNOCOMPROMETIDOS - atualização 09/01/2023

IMUNOCOMPROMETIDOS PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM ASTRAZENECA, PFIZER, CORONAVAC



Esquema primário

- CoronaVac: Intervalo de 4 semanas (28 dias) após D1.

- Comirnaty/Pfizer: Intervalo de 3 semanas (21 dias) após D1, para 12 anos ou mais de idade - Conforme Deliberação CIB-SUS-MG Nº 3632.

- AstraZeneca: Intervalo de 8 semanas após D1.

Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO POR GRUPO ETÁRIO, PARA QUEM INICIOU ESQUEMA COM JANSSEN - atualização 09/01/2023


GRUPO ETÁRIO PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM JANSSEN



Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.

ESQUEMA DE VACINAÇÃO PARA IMUNOCOMPROMETIDOS, QUE INICIARAM ESQUEMA COM JANSSEN - atualização 09/01/2023

IMUNOCOMPROMETIDOS PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM JANSSEN



Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. 2ª edição. Brasília : Ministério da Saúde, páginas 34 e 35, 2022.