

PRINCIPAIS DÚVIDAS

VACINA COVID-19 MONOVALENTE XBB NA ESTRATÉGIA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM 2024 (a partir de 20 maio de 2024)

1. Quem pode receber a vacina COVID-19 monovalente XBB?

Resposta:

- Crianças entre seis meses e menores de cinco anos de idade;
- Grupos prioritários a partir de cinco anos de idade; e
- População geral a partir de cinco anos de idade (sem nenhuma dose de vacina COVID-19 prévia).

2. Qual o esquema vacinal para crianças entre seis meses e menores de cinco anos?

Resposta:

Crianças de 6 meses a 4 anos 11meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Recomendação vacina COVID-19 (XBB), Moderna	Vacina Covid-19- RNAm, (XBB) Moderna (Spikevax) Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19- RNAm (XBB) Moderna (Spikevax) Registro: 2ª Dose (D2)	-	D1 para D2: 4 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

ATENÇÃO: Se a criança chegar para tomar a vacina e tiver recebido:

- Se nenhuma dose. O que fazer?

Iniciar o esquema composto por 2 (duas) doses com a vacina COVID-19 monovalente XBB, com intervalo de 4 (quatro) semanas entre as doses e encerrar o esquema.

- Se somente 1 (uma) dose da Pfizer. O que fazer?

Crianças que receberam somente 1 (uma) dose da vacina COVID-19 da Pfizer, devem completar seu esquema com 2 (duas) doses da vacina COVID-19 monovalente XBB, com o intervalo mínimo de 4 (quatro) semanas entre a primeira e a segunda doses e de 8 (oito) semanas entre a segunda e a terceira doses e encerrar o esquema

Crianças de 6 meses a 4 anos 11meses e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Se 1 dose da Pfizer pediátrica	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: 2ª Dose (D2)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

- Se 2 (duas) doses da Pfizer. O que fazer?

Crianças que receberam 2 (duas) doses da vacina COVID-19 da Pfizer, devem completar seu esquema com 1 (uma) dose da vacina COVID-19 monovalente XBB, com o intervalo mínimo de 8 (oito) semanas entre a segunda e a terceira doses e encerrar o esquema.

Crianças de 6 meses a 4 anos 11m e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Se 2 doses da Pfizer	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª Dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: 1ª Dose (D1)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

- Se 3 (três) doses da Pfizer (esquema primário completo). O que fazer?

Crianças que receberam 3 (três) doses da vacina COVID-19 da Pfizer, devem receber mais 1 (uma) dose da vacina COVID-19 monovalente XBB, com o intervalo mínimo de 3 (três) meses da última dose recebida e encerrar o esquema. Esta dose deverá ser registrada como “dose” (D).

Crianças de 6 meses a 4 anos 11m e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Dose com a vacina XBB	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Se 3 doses da Pfizer	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 2ª Dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, Pfizer (Comirnaty) pediátrica menor de 5 anos Registro: 3ª Dose (D3)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: Dose (D)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas D3 para D: 3 meses	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

- Se somente 1 (uma) dose da CoronaVac. O que fazer?

Crianças que receberam somente uma dose da vacina CoronaVac, devem completar seu esquema com 2 (duas) doses da vacina COVID-19 monovalente XBB, com o intervalo mínimo de 4 (quatro) semanas entre a primeira e a segunda doses e de 8 (oito) semanas entre a segunda e a terceira doses e encerrar o esquema.

Crianças de 6 meses a 4 anos 11m e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Se 1 dose da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/ Butantan (Coronavac) Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: 2ª Dose (D2)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

- Se 2 (duas) doses da CoronaVac. O que fazer?

Crianças que receberam 2 (duas) doses da vacina CoronaVac, devem completar seu esquema com 1 (uma) dose da vacina COVID-19 monovalente XBB, com o intervalo mínimo de 8 (oito) semanas entre a segunda e a terceira doses e encerrar o esquema.

Crianças de 6 meses a 4 anos 11m e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Se 2 doses da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/ Butantan (Coronavac) Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/ Butantan (Coronavac) Registro: 2ª Dose (D2)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: 1ª Dose (D1)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

- Se 3 (três) doses da CoronaVac. O que fazer?

Crianças que receberam 3 (três) doses da vacina CoronaVac, devem receber mais 1 (uma) dose da vacina COVID-19 monovalente XBB, com o intervalo mínimo de 3 (três) meses da última dose recebida e encerrar o esquema. Esta dose deverá ser registrada como “dose” (D).

Crianças de 6 meses a 4 anos 11m e 29 dias	Dose 1	Dose 2	Dose 3	Dose com a vacina XBB	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Se 3 doses da CoronaVac	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/ Butantan (Coronavac) Registro: 1ª Dose (D1)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/ Butantan (Coronavac) Registro: 2ª Dose (D2)	Vacina Covid-19-inativada, Sinovac/ Butantan (Coronavac) Registro: 1ª Reforço (R1)	Vacina Covid-19-RNAm, XBB 1.5 Moderna (Spikevax) Registro: Dose (D)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas D3 para D: 3 meses	Modelo Informacional: RIA-Rotina (RIA-R) Estratégia: Rotina

*SI – Sistema de informação.

ATENÇÃO: Para crianças imunocomprometidas entre seis meses e menores de cinco anos de idade, o esquema vacinal deverá ser composto por TRÊS DOSES, independente do imunizante utilizado, com intervalos de 4 (quatro) semanas entre a primeira e segunda dose e de 8 (oito) semanas entre a segunda e terceira dose.

3. Qual a recomendação para os grupos prioritários a partir de 5 anos de idade?

Resposta: Deverão receber UMA DOSE da vacina COVID-19 monovalente XBB, independente do esquema vacinal prévio com vacinas originais Wuhan ou bivalentes. Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes/puerperas ou imunocomprometidos, deverão receber DUAS DOSES, com intervalo mínimo de 6 (seis) meses entre as duas doses.

ATENÇÃO: Somente pessoas com 60 anos ou mais, gestantes/puérperas ou imunocomprometidos, deverão receber DUAS DOSES, com intervalo mínimo de seis meses entre as duas doses.

Grupos prioritários	Intervalo entre as doses	Registro no SI*
Pessoas de 60 anos ou mais	6 meses	Dose (D)
Pessoas imunocomprometidas		Modelo Informacional: RIA-Campanha (RIA-C)
Gestantes e puérperas		**Estratégia: Campanha Seletiva
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores		
Indígenas		Dose (D)
Ribeirinhos		
Quilombolas		
Trabalhadores da saúde		
Pessoas com deficiência permanente		Modelo Informacional: RIA-Campanha (RIA-C)
Pessoas com comorbidades		**Estratégia: Campanha Seletiva
Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos)	Anual	
Funcionários do sistema de privação de liberdade		
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas		
Pessoas em situação de rua		

*SI – Sistema de informação

** Para os sistemas que captam essa informação.

4. Qual o intervalo mínimo entre a dose da vacina COVID-19 monovalente XBB e a última dose de vacinas originais ou bivalentes para pessoas dos grupos prioritários?

Resposta: O intervalo mínimo recomendado entre a última dose de qualquer vacina COVID-19 (cepa original) e a vacina COVID-19 monovalente XBB, da fabricante Moderna, é de 3 (três) meses.

5. Qual o esquema vacinal para população geral a partir de cinco anos de idade?

Resposta: Pessoas a partir de 5 anos de idade que não fazem parte dos grupos prioritários que nunca foram vacinados (nenhuma dose), terão a oportunidade de se

vacinar com o esquema primário (UMA DOSE da vacina COVID-19 monovalente XBB). Esta dose deverá ser registrada como “dose” (D).

6. Qual o esquema primário para imunocomprometidos?

Resposta: O esquema primário de pessoas imunocomprometidas ou em situação de revacinação (transplante de células-tronco hematopoiéticas) é de 3 (três) doses da vacina COVID-19 monovalente XBB. Se estiver com o esquema de vacinação incompleto, deverão completar o esquema para totalizar 3 (três) doses. Com intervalos de 4 (quatro) semanas entre a primeira e segunda dose e de 8 (oito) semanas entre a segunda e terceira dose.

7. Como será realizado o registro para a vacina COVID-19 monovalente XBB nos sistemas de informação?

Resposta:

População	Estratégia	Dose
Crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade	Rotina	Dose (D) ** 1ª dose (D1), 2ª dose (D2) ou 3ª dose (D3)
Grupos prioritários (a partir de cinco anos de idade)	*Campanha Seletiva	Dose (D)
Pessoas não vacinadas anteriormente (a partir de cinco anos de idade)	*Campanha Seletiva	Dose (D)
Pacientes após transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)	*Campanha Seletiva	1ª dose revacinação (D1 REV) 2ª dose revacinação (D2 REV) 3ª dose revacinação (D3 REV)

*Para os sistemas que captam essa informação.

** Para crianças que completaram seus esquemas com as vacinas da Pfizer e da CoronaVac.

8. O que fazer com as doses das vacinas monovalentes cepa original (Wuhan) e bivalentes remanescentes?

Resposta: A recomendação é utilizar as vacinas atualizadas, com a cepa XBB, e aguardar novas orientações sobre as vacinas COVID-19 monovalentes cepa Wuhan e bivalentes.

9. E a vacinação para viajantes, qual a recomendação?

Resposta: Em caso de viagem, devem ser verificadas as exigências do país de destino. Caso o país exija esquema vacinal, e o indivíduo NÃO tiver nenhuma dose, este poderá receber o esquema de até 2 (duas) doses. Estados e municípios poderão avaliar as situações individualmente com intuito de encontrarem o melhor esquema vacinal, de

acordo com a disponibilidade do imunizante e exigências dos países de destino, que garanta proteção e segurança ao indivíduo.

10. Qual a conduta em imunização para crianças que iniciaram o esquema de vacinação antes dos 5 anos de idade (receberam D1 ou D2 de vacinas Pfizer pediátrica ou CoronaVac) e retornaram à unidade de saúde após os cinco anos de idade?

Resposta: Crianças que não fazem parte dos grupos prioritários e estão em situação de transição de idade não tem recomendação de receber novas doses de vacinas XBB. Considerar esquema completo e encerrar.

11. Qual a conduta em imunização para crianças que não fazem parte dos grupos prioritários que receberam o esquema de vacinação de 3 (três) doses de vacinas COVID-19 antes dos cinco anos de idade (vacinas Pfizer pediátrica ou CoronaVac) e retornaram à unidade de saúde após os cinco anos de idade?

Resposta: Nesse momento não há indicação de doses adicionais. Considerar esquema completo e encerrar.

12. Como será realizada a cobertura vacinal para crianças e grupos prioritários?

Resposta: Para o cálculo das coberturas vacinais serão consideradas crianças menores de um ano de idade. Para idosos a partir de 60 anos o cálculo será por faixa etária. Os demais grupos serão consideradas somente as doses aplicadas.