



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REDE DE FRIO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DO FRASCO, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

<u>VACINA</u>	<u>LABORATÓRIO</u>	<u>CONSERVAÇÃO</u>	<u>PRAZO PARA UTILIZAÇÃO/ APÓS A ABERTURA DO FRASCO</u>
BCG	Serum Institute of Índia	+2 °C a + 8 °C	6 horas
Hepatite B	Instituto Butantan	+ 2 °C a + 8 °C	15 dias
	Instituto Butantan/LG	+2°C + 8°C	10 dias
	LG CHEMICAL	+2°C + 8°C	28 dias
Pentavalente (DTP/Hib/HB)	Serum Institute of Índia	+2 °C a +8 °C	28 dias
	PANACEA BIOTEC LTD	+2 °C a +8 °C	28 dias
Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) VIP	Bio-Manguinhos	+2 °C a + 8 °C	28 dias.
Febre Amarela	Bio-Manguinhos/Fiocruz	+2 °C a +8 °C	06 horas.
Rotavírus humano G1P[8] (atenuada)	Bio-Manguinhos/Fiocruz	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato
	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - BELGICA	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato
Pneumocócica 10 – valente (conjugada)	Bio-Manguinhos/Fiocruz GLAXOSMITHKLINE BEECHAM	+2 °C a +8 °C +2 °C a +8 °C	28 dias



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REDE DE FRIO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DO FRASCO, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

Hexavalente	Sanofi Pasteur	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato
Meningocócica C (conjugada)	Fundação Ezequiel Dias (FUNED)	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato
Haemophilus Influenzae tipo b	Serum Institute of Índia	+2 °C a + 8 °C	6 horas
Sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) - SCR	Serum Institute of Índia	+2 °C a +8 °C	6 horas
DTP	Serum Institute of Índia	+2 °C a +8 °C	28 dias
Raiva/ celular /vero	Sanofi Pasteur	+ 2 °C a + 8 °C	06 horas
Hepatite A (inativada) infantil	Instituto Butantan	+ 2 °C a + 8 °C	Unidose – uso imediato
Varicela (atenuada)	GC BIOPHARMA CORP.	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato
Difteria e tétano adulto	Serum Institute of Índia	+2 °C a +8 °C	28 dias
	Biofarma	+2 °C a +8 °C	28 dias
Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante)	Instituto Butantan	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato
Meningocócica ACWY (conjugada)	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. - BELGICA	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato.
dTpa (gestante)	Instituto Butantan/GSK	+2 °C a +8 °C	Unidose – uso imediato



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REDE DE FRIO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DO FRASCO, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

Pneumococo 23	Instituto Butantan	+2 °C a + 8 °C	Unidose – uso imediato
Vacina Covid 19. RNAM- moderna (SPIKEVAX)	Adium S.A	Após descongelamento por 30 dias (+2 °C a +8°C)	19 horas
Vacina Covid-19- RNAm, Pfizer	Pfizer	+2 °C a + 8 °C	12 horas - entre 2°C e 25°C
Vacina Covid-19- recombinante, Serum/Zalika	Serum/ Zalika	+2 °C a + 8 °C	12 horas
Vacina Tetra Viral	GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. – BELGICA/ FIOCRUZ	+2 °C a + 8 °C	8 horas
Dengue 1,2,3 e 4 (atenuada)	TAKEDA	+2 °C a + 8 °C	02 horas
Influenza trivalente	Instituto Butantan	+2 °C a + 8 °C	07 dias.

Data de atualização: Março/2025.

*** O armazenamento dos diluentes das vacinas, deve seguir as recomendações do fabricante.**